

CONGENITALE
LUXATION DES RADIUSKÖPFCHENS
MIT
VERERBUNG.

INAUGURAL-DISSERTATION
VERFASST UND DER
HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER
FRIEDRICH-ALEXANDERS-UNIVERSITÄT ZU ERLANGEN
ZUR
ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE
EINGEREICHT
VON
DR. MED. OTTO MÜNTER
PRAKT. ARZT
AUS SACHSENBERG IN WALDECK.

18. JULI 1897.

WÜRZBURG.
DRUCK DER K. UNIVERSITÄTSDRUCKEREI VON H. STÜRTZ.
1899.

Tag der mündlichen Prüfung 18. Juli 1898.

Referent: Prof. Dr. Hauser.

MEINEN ELTERN.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die angeborenen Luxationen haben von alters her das Interesse der Mediziner in hohem Masse in Anspruch genommen, sowohl wegen ihrer theoretischen wie praktischen grossen Bedeutung. Wenn auch der ärztliche Forschersinn sich vielfach mit der Frage über die Entstehung der kongenitalen Luxationen befasst hat und eine ganze Reihe von Hypothesen aufgestellt ist, ein abschliessendes Resultat ist noch nicht erzielt worden. Bereits Hippokrates sind die angeborenen Verrenkungen bekannt gewesen und nach ihm haben sich fast alle bekannteren Autoren mit denselben beschäftigt. Einiges Licht in diese Frage aber brachte erst Dupuytren, der die angeborenen Hüftgelenksluxationen, die man vordem für eine vom Rückenmark ausgehende nervöse Erkrankung hielt, diagnostizieren lehrte. Schreger in Nürnberg, der Gelegenheit hatte, zwei Individuen (einen Erwachsenen und ein Kind) mit angeborenen Hüftgelenksluxationen zu secieren, brachte Klarheit in die anatomischen Verhältnisse, indem er die Beziehungen zwischen Gelenkpfanne und -kapsel einerseits und Femurkopf andererseits darlegte. Wenn bis dahin überhaupt von angeborenen Luxationen die Rede gewesen war, so hatte es sich fast ausschliesslich um Oberschenkelluxationen gehandelt; nur spärlich waren die Notizen über Luxationen des Oberarms, des Ellenbogengelenks, der Kniescheibe u. s. w. Erst Adams beschäftigte sich intensiv mit Luxationen des Radiusköpfchens. Des weiteren wurden Beobachtungen von angeborenen Radiusluxationen berichtet von Cruveilhier, Dupuytren, Chaussier, Smith u. a. Bessel-Hagen freilich glaubt, dass wohl die Mehrzahl der speziell von Adams aufgeführten Fälle von angeborener Radiusluxation eine scharfe Kritik nicht bestehen könne, da in einem einzigen Falle das Angeborensein sicher erwiesen sei: die Radiusluxation wurde meist erst an der Leiche entdeckt. Mit dieser Ansicht schliesst er sich Malgaigne an in dessen Arbeit: „Die Knochenbrüche und Verrenkungen“. Fälle, bei denen durch kariöse Zerstörungen ein Defekt des Bandapparates und infolgedessen eine

Verlagerung des Radiusköpfchens erfolgt war, können natürlich nicht zu den kongenitalen Luxationen gerechnet werden, ebensowenig der von Bartels berichtete Fall, wo bei einem Manne, der in seiner Jugend ständig eine schwere Karre hatte schieben müssen und auch noch dazu angehalten worden war, als er starke Schmerzen in beiden Ellenbogengelenken verspürte, eine habituelle doppel-seitige Luxation des Radiusköpfchens eingetreten war; hier wurde die Luxation bedingt durch eine Lockerung des Bandapparats. Im grossen und ganzen ist die Anamnese der kongenitalen Radiusluxationen eine mangelhafte. Auffallend häufig finden sich die angeborenen Radiusluxationen in Gemeinschaft mit multiplen kartilaginären Exostosen und Bessel-Hagen meint, dass durch die Exostosenbildung ein Hemmnis für das Längenwachstum der Röhrenknochen geschaffen wurde, dass mithin durch die Wachstumshemmung des einen von zwei paarigen Röhrenknochen eine Verlagerung des anderen bedingt sein könne und dass sich so z. B. bei Verkürzung der Ulna durch Exostosenbildung ein Weiterwachsen und damit eine Luxation des Radiusköpfchens erklären liesse. Er folgert daraus, dass die Radiusluxationen erst eine Sekundärererscheinung der Exostosenbildung seien, mithin nicht angeboren, da nach Marchand die Entstehung der kartilaginären Exostosen hauptsächlich in das jugendliche Alter, die Zeit des Knochenwachstums fällt. Bessel-Hagen führt eine Reihe von Beispielen von multipler Exostosenbildung bei gleichzeitiger Luxation des Radius an, auf die er seine Ansicht stützt. Ob seine Erklärung auch auf die von mir beobachteten Fälle passt, werden wir später sehen.

Der zur Erklärung der angeborenen Luxationen aufgestellten Theorien giebt es eine ganze Anzahl, die ich zur Vervollständigung und zum besseren Verständnis nach Krönleins Zusammenstellung kurz folgen lasse. Bei den meisten derselben handelt es sich zwar speziell um kongenitale Hüftgelenksluxationen, doch lassen sich daraus auch Schlüsse ziehen auf die Luxationen anderer Gelenke.

1. Die sogen. kongenitalen Luxationen sind traumatischer Natur, verursacht durch Gewalteinwirkung auf den schwangeren Leib von aussen (Stoss, Fall oder dergl.), oder durch ein Trauma während des Geburtsaktes (künstliche Entbindung).

2. Die kongenitale Luxation ist eine Spontanluxation, bedingt durch eine Erweichung und Erschlaffung des Bandapparats oder durch fötale Gelenkhydropsie,

3. soll schuld sein eine absonderliche Lage des Fötus im Uterus. Infolge allzu geringer Menge des Fruchtwassers soll auch eine Luxation durch Kompression verursacht werden können; doch fand Krönlein bei Nachforschungen, dass meistens ausdrücklich auf die reichliche Menge Fruchtwasser bei den in Rede stehenden Luxationen hingewiesen wurde.

4. sollen die kongenitalen Luxationen Produkte einer primitiven Muskelretraktion sein, wie sie zur Erklärung des Klumpfusses, des Schiefhalses, sowie der Verkrümmung der Wirbelsäule angenommen wurden.

5. Die kongenitalen Luxationen sind das Endergebnis einer Paralyse und Atrophie der Becken-Oberschenkelmuskulatur.

6. „Die kongenitale Femurluxation ist in der Mehrzahl der Fälle — und diese dürfen gerade als die typischen bezeichnet werden — auf einen Bildungs- und Entwicklungsfehler zurückzuführen, welcher es zur keiner normalen Gestalt der Gelenkenden kommen lässt“. „v. Ammon, der nebst anderen Autoren (Schreger, Dupuytren etc.) diese allgemein gehaltene Theorie von Paletta angenommen hatte, sagt: „... vielmehr ist in vielen Fällen teils die Gewissheit, teils die grösste Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass das Übel in einem Stehenbleiben der gesamten Gelenkpartien auf einer früheren fötalen Bildungsstufe beruht“. „Es giebt Fälle von sogen. angeborenen Luxationen, wo der Gelenkkopf niemals seine entsprechende Gelenkfläche erst verlasst, also luxiert wird, sondern vielmehr niemals in dieselbe auf normale und gehörige Weise sich eingefügt hat“. Kurz gesagt: Die kongenitale Luxation des Hüftgelenks beruht auf einer „Bildungshemmung“ und man versteht unter ihr bei kongenitaler Luxation „eine ganz bestimmte, anatomisch genau charakterisierte und diagnostizierbare Veränderung von ebenfalls genau festgestellten Knochenknorpelgrenzen“. Bei anderen Luxationen (also auch bei kongenitalen Radiusluxationen) liegt demnach analog den Hüftgelenkluxationen auch eine Missbildung vor. „Ob dieselben aber als Bildungshemmungen zu bezeichnen sind, oder aber, wie v. Ammon glaubt, als „schon ursprünglich pathologische Zustände, deren entfernte Ursachen ebenso in dynamischen wie mechanischen Einflüssen liegen können“, muss vorläufig dahingestellt bleiben“.

In ähnlichem Sinne äussert sich v. Volkmann (Plitha und Billroth, Hdb. f. Chir. II.), der die angeborenen Luxationen für an-

geborene Missbildungen, *vitia primae formationis* erklärt. „Es handelt sich bei ihnen offenbar fast immer um Störungen der ganz unbekannten Kräfte, welche bei der Entwicklung der Frucht und dem Wachstum des Körpers die typische Form und Anordnung der Teile bestimmen. Man kann sich den Vorgang so vorstellen, dass bei der Differenzierung der ursprünglich kontinuierlichen Skeletanlage die Keime beider Gelenkenden nicht aufeinander zu, sondern aneinander vorbei wachsen“.

Von den in der Literatur angeführten Fällen von kongenitaler Radiusluxation mögen hier diejenigen folgen, bei denen das Angeborensein wohl ausser Zweifel steht.

1. Servier beobachtete einen Fall von kongenitale Verlagerung des capitulum radii, wo diese gemeinsam mit einer vom Vater ererbten Kniescheibenluxation und mit ebenfalls erbtem Klumpfuss auftrat. 2. In dem von Mitscherlich mitgeteilten Falle, der ein 6jähriges Mädchen betrifft, finden wir: doppelseitigen Klumpfuss und Flexionskontrakturen an Händen und Fingern; ausserdem beide Arme verkürzt und Luxation des capitulum radii nach vorn, „welche ihrerseits mit einer Beschränkung der Flexions- und Pronationsbewegungen und mit hochgradigen Anomalien in der anatomischen Beschaffenheit der Gelenkkörper und ihren Beziehungen zum Bandapparat verbunden war“. — In diesen beiden Fällen finden wir die Radiusluxation gemeinsam mit anderen Missbildungen an den Extremitäten. 3. Fall, beobachtet von Senftleben. Es handelt sich um einen militärpflichtigen Mann, der mit einem Defekt der Ulna und gleichzeitiger Luxation des Radiusköpfchens am linken Ellenbogen behaftet war. Der linke Vorderarm war erheblich verkürzt und nur ein gekrümmter Röhrenknochen, der Radius, fühlbar. An Stelle der Ulna fühlte Senftleben nur einen ligamentösen Strang. Trotz dieser bedeutenden Missbildung war der Arm gebrauchsfähig, sodass sogar sein Träger befürchtete, er könne noch militärtauglich befunden werden. 4. Fall, mitgeteilt von Derville, ganz analog dem Senftlebenschon Falle. Statt der normalen Vorderarmknochen war nur der verkürzte und verkrümmte Radius und ein die Ulna vertretender ligamentöser Strang zu fühlen.

Auf Grund dieser beiden letztgenannten Fälle beweist Humphrey, dass hier die Luxation des Radius bedingt sei durch eine Hemmung des Längenwachstums der Ulna und Bessel-Hagen verwertet diesen Schluss auch für seine Ansicht: die sogen. kon-

mentale Radiusluxation sei eine Sekundärerscheinung der durch Exostosenbildung verursachten Wachstumshemmung der Ulna.

Ich lasse nunmehr die Beschreibung meiner Beobachtungen folgen.

I. Fall: Der Bahnstreckenarbeiter T. ist 49 Jahre alt. Seine Eltern und näheren Angehörigen sollen gesund gewesen sein; von irgend welchen Anomalieen in der Knochenbildung bei ihnen oder bei Geschwistern ist ihm nichts bekannt. Der Geburtsverlauf ist ein normaler gewesen; doch soll gleich nach seiner Geburt beim Waschen die Hebamme die Unregelmässigkeit am rechten Ellenbogen, bestehend in einem harten Vorsprung, bemerkt haben. In seiner Jugend ist T. ein schwächliches Kind und nach Aussage eines seiner Zeit zu Rate gezogenen Arztes in seinen ersten Lebensjahren mit der „englischen Krankheit“ behaftet gewesen, nach deren Ablauf, zu Anfang des 3. Lebensjahres, an einzelnen Gelenken knochenharte Geschwülste bemerkt worden sein sollen. Während seiner Schulzeit will T. häufig durch Schmerzen in der rechten Schulter und Oberarm belästigt worden sein. Ein auffallendes Wachstum der Knochenverdickungen hat er nicht bemerkt. Auf überstandene Kinderkrankheiten kann er sich nicht besinnen. T. ist 160 cm gross; es fällt bei seiner Erscheinung auf der ziemlich umfangreiche, viereckige Kopf. Die Grössenverhältnisse der übrigen Körperteile sind gut proportioniert. Fettpolster und Muskulatur sind leidlich gut entwickelt. In die Augen fallen neben der fingerhutförmigen Hervorstülpung an der Aussenseite des rechten Ellenbogens mehrere Verdickungen in der Nähe der Gelenke der Extremitäten, welche haselnuss- bis wallnussgross sind; am zahlreichsten sind sie an Hand- und Kniegelenk und imponieren sofort als Exostosen. Es sind deren sicht- und fühlbar: am linken Oberarm im proximalen Viertel je eine vorn und hinten, am linken Unterarm in der Nähe des Handgelenks je drei an Radius und Ulna; am rechten Unterarm sechs: am Radius vier, an der Ulna zwei. Rechte und linke Tibia zeigen am proximalen Ende je eine Exostose nach innen, die linke Fibula eine Exostose nach aussen. Im Schädel sind keine Exostosen wahrnehmbar; am Thorax sind die Rippenknorpelenden verdickt; das Becken bietet keine besonderen Erscheinungen. Am rechten Ellenbogen fällt die schon oben erwähnte fingerhutförmige Hervorstülpung ins Auge, ein 1 cm langer Vorsprung in der Verlängerung der Radiuslängsachse mit einer Gelenkfläche, der sich bei Beugung und Streckung des

Unterarms, bei Pronation und Supination mitbewegt und als das capitulum radii sich herausstellt. Dieses ist mit einer ziemlich dünnen Hautschicht überzogen und wegen seiner ungeschützten, exponierten Stellung leicht Verletzungen ausgesetzt. (Gelegentlich einer solchen oberflächlichen Exkoration infolge eines Stosses bin ich auch auf den vorliegenden Fall aufmerksam gemacht worden). Diese eigentümliche Verlagerung des Radiusköpfchens muss natürlich auf die Länge und die Funktionen der ganzen Extremität von Einfluss sein. Es folgen zunächst die Maasse:

Länge d. rechten Armes vom Akromion bis zur Mittelfingerspitze:	63 cm
„ „ linken „ „ „ „ „ „	65 cm
„ „ rechten Oberarmes vom Akromion bis zum Ellenbogen:	32 cm
„ „ linken „ „ „ „ „ „	30 cm
„ „ rechten Radius:	20 cm
„ „ linken „	21 $\frac{1}{2}$ cm
„ „ rechten Ulna:	16 cm
„ „ linken „	17 cm
Umfang des rechten Ellenbogengelenkes:	23 cm
„ „ linken „	24 cm
„ „ rechten Handgelenkes:	14 cm
„ „ linken „	15 cm

Auffallend an diesen Maassen ist das Verhältniss zwischen der Länge des Radius und der der Ulna. Wenn unter normalen Verhältnissen die Ulna 2 cm länger sein soll als der zugehörige Radius, so zeigt hier die rechte Ulna eine relative Verkürzung um 6 cm, die linke Ulna eine solche um 5 cm. Funktionsstörungen: Die Kraft des rechten Armes soll stets eine geringere gewesen sein als die des linken; die Gebrauchsfähigkeit ist eine leidlich gute. Was die einzelnen Arten der Bewegungen betrifft, so ist die Beugung im rechten Ellenbogengelenk unbehindert, die Streckung nicht ganz vollkommen; die Pronation lässt sich ohne Hemmung gut ausführen, die Supination ist nur etwa $\frac{2}{3}$ möglich; bei beiden letzteren Bewegungen sind Reibungen fühl- und hörbar. Von der Insertion der Bicepssehne ist in Ruhe und bei Bewegung nichts bestimmtes zu fühlen oder zu sehen. Bei starkem Druck gegen die Hand, der ohne Schmerzempfindung ausgehalten wird, ist von einer Verschiebung des Gelenk- oder Bandapparates am Ellenbogen nichts wahrzunehmen. Durch die Missbildung ist der Träger desselben nur insofern benachteiligt, als der rechte Arm leichter er-

Länge d. rechten Radius:	21 cm
„ „ linken	22 cm
„ der rechten Ulna:	18 cm
„ „ linken	23 cm

Waren die Funktionsstörungen schon beim Vater nicht sehr bedeutend, so sind sie es noch weniger beim Sohne. Die Beugung im Ellenbogengelenk kann vollständig, die Streckung nahezu vollständig, die Pronation vollkommen, die Supination mit ganzer geringer Beschränkung ausgeführt werden. Die Ab- und Adduktionsbewegungen, sowie Beugung und Streckung im Handgelenk sind uneingeschränkt. Die Kraft des rechten Armes ist der des linken nahezu gleich.

Ein Vergleich der beiden Fälle zeigt uns fast genau dasselbe Bild. Nicht nur die analoge Exostosenbildung sondern vor allem die Luxation des Radiusköpfchens erregt unser spezielles Interesse. Ich glaube, dass an dem Angeborensein dieser Anomalität von vornherein nicht gezweifelt werden kann. T. sen. behauptet, dass nach Überlieferung seiner Mutter die Hebamme unmittelbar nach seiner Geburt auf die eigenartige Erscheinung an seinem rechten Ellenbogen aufmerksam gemacht hat und bei seinem ältesten eben beschriebenen Sohne hat er gleich nach dessen Geburt dieselbe Beobachtung gemacht. Ein ähnliches Vorkommnis ist ihm in seiner ganzen Verwandtschaft nicht bekannt; wohl hat ein später geborener, jung verstorbener Sohn unterhalb eines jeden Knies eine Knochengeschwulst gehabt, aber keine Missbildung am Ellenbogen. Das jüngste dritte Kind des T., jetzt vier Jahre alt, zeigt noch keine Exostosen. Deutlicher als jede Beschreibung sprechen die Abbildungen unserer Fälle. Fig. 1 zeigt die äussere Gestalt der Radiusköpfchen, die gelegentlich der photographischen Aufnahmen in der chirurgischen Klinik zu Göttingen anfänglich ebenfalls als Exostosen diagnostiziert wurden. Beim Vater ist der Ellenbogen etwas stark nach vorne gedreht und darum erscheint der Vorsprung etwas kürzer. Auch die Exostosen, besonders an den Handgelenken sind zum Teil sichtbar. Auf Fig. 2 und 3 sehen wir das Ellenbogengelenk und die Vorderarmknochen des Vaters. Bei Abb. 2 fällt der dünne Humerus auf. Der Radius mit gut ausgebildetem Capitulum und Tuberositas überragt das Olekranon um ein bedeutendes Stück, lateral vom Condylus int. vorbeischiebend. Bild 3, in halber Pronationsstellung aufgenommen, zeigt, dass das Humero-ulnar-Gelenk gut entwickelt ist, ferner er-

kennt man die stark verkürzte, distal rudimentäre und mit Exostosen versehene Ulna; desgleichen weist der gekrümmte Radius in der Handgelenksgegend die schon erwähnten Exostosen auf. Die Abbildungen 4 und 5 führen uns Ellenbogen- und Handgelenk des Sohnes in Supinationsstellung vor Augen. Auffallend ist das Fehlen des condylus internus am Humerus, an dem das wohl erhaltene capitulum radii weit vorbeiragt. Radius und Ulna sind gleichmässig gekrümmt. Die Ulna endet vorzeitig ohne Griffelfortsatz mit kleinen Exostosen; der Radius trägt an seinem durch Exostosen verdickten distalen Ende die Handwurzelknochen an ganz abgesschrägter Gelenkfläche.

Wenn auch schon ausser Frage steht, dass die Anomalien angeboren sind, so spricht auch noch die Vererbung dafür; ist doch auch die Vererbung anderer Missbildungen z. B. der kongenitalen Hüftgelenksluxationen eine feststehende Thatsache. Obwohl auch das Fehlen des condylus internus beim Sohne, der beim Vater doch vollständig entwickelt ist, zum Beweis anführen lässt? Man könnte an einen progressiven Charakter der Missbildung denken. Die Ansicht Bessel-Hagen's, dass bei Anwesenheit von Exostosen eine Radiusluxation nicht kongenital, sondern eine Sekundärererscheinung sei, trifft für unsere Fälle nicht zu. Wie die Abbildungen zeigen, befinden sich die meisten und grössten Exostosen am Radius. Warum sollte nun gerade die Ulna im Wachstum zurückbleiben und der Radius bis zur normalen Grösse sich weiter entwickeln? Zudem steht fest, dass die Exostosen beim Vater erst zu Anfang des 3. Lebensjahres (nach Rhachitis?) und beim Sohne auch nicht in den ersten Lebensjahren bemerkt worden sind, während die Missbildungen am Ellenbogen sofort bei der Geburt aufgefallen sind.

Was meine Ansicht über die Entstehung der vorliegenden Radiusluxation betrifft, so bin ich geneigt sie auf eine Missbildung im Sinne v. Volkmanns und Krönleins, auf ein vitium primae formationis zurückzuführen. Sehr beachtenswert ist immerhin das gleichzeitige Bestehen der Exostosen und die rudimentäre Entwicklung der Ulna.

Am Schlusse meiner Arbeit gestatte ich mir meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Hauser in Erlangen für die Uebernahme des Referats und Herrn Dr. Pels-Leusden, Assistenten der chirurgischen Klinik zu Göttingen, für die Anfertigung der Photographieen meinen tiefgefühltesten Dank auszusprechen.

Literatur.

Archiv für klin. Chirurgie, Bd. 41, p. 421, 505, 749.

Deutsche Chirurgie, 26. Lieferung 1882.

Plitha u. Billroth, Handbuch der Chirurgie II, 2. Abt. 1, p. 668.

Virchows Archiv, Bd. 45, p. 303.

Eulenburs Realencyklopädie: Exostosis von Marchand.





Fig. 1.




Fig. 2.



3.



Fig. 4.




Fig. 5.

